

Kytta-Plasma[®] f

Wirkstoff: Beinwellwurzel-Fluidextrakt



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

100 g Kytta-Plasma[®] f enthalten:
Beinwellwurzel-Fluidextrakt (1:2) 30,0 g
(Auszugsmittel: Ethanol 60 Vol.-%).

Sonstige Bestandteile:

2-Phenoxyethanol-(butyl, ethyl, isobutyl, methyl, propyl) (4-hydroxybenzoat), Aluminium-Magnesium-Silicat, Parfümöl Spezial PH 0322791, weißer Ton, Glycerol, Lavendelöl, Fichtennadelöl.

Darreichungsform und Inhalt

Packung mit 200 g Paste (N1)
Packung mit 400 g Paste (N2)

Stoff- oder Indikationsgruppe und Wirkungsweise

Der in Kytta-Plasma[®] f enthaltene Wirkstoff Beinwellwurzel-Fluidextrakt dient zur äußerlichen Anwendung gegen Entzündungen, Schwellungen und Schmerzen.

Pharmazeutischer Unternehmer

Merck Selbstmedikation GmbH
Röbberstraße 96
64293 Darmstadt
Tel.-Nr.: 061 51/8 56-260
Fax-Nr.: 061 51/8 56-203
www.merckselbstmedikation.de

Hersteller

Merck Kommanditgesellschaft auf Aktien + Co.
Werk Spittal
A-9800 Spittal/Drau

Anwendungsgebiete

Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen.
Zur Anwendung auf der Haut.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Kytta-Plasma[®] f nicht anwenden?

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Beinwell, Parabene oder einen der sonstigen Inhaltsstoffe von Kytta-Plasma[®] f darf das Arzneimittel nicht angewendet werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und der Stillzeit beachten?

Die Anwendung in der Schwangerschaft sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Kytta-Plasma[®] f soll nicht in die Augen, auf Schleimhäute oder auf offene Wunden aufgetragen werden.

Die Anwendung darf nur auf intakter Haut erfolgen.

Zur Entlüftung der Tube die Schraubkappe entfernen, die Tube an der Naht mehrmals leicht aufstoßen, damit sich die Paste absenken kann. Anschließend die Tube zusammendrücken, bis die Paste die Tubenöffnung erreicht hat und die Luft entwichen ist. Danach die zusammengedrückte Tube mit der Schraubkappe fest verschließen und durchkneten. Wichtig: Vor jedem Gebrauch Tube auf diese Weise entlüften und durchkneten.

Worauf müssen Sie noch achten?

Aufgrund des Gehaltes an Methyl-, Ethyl- und Propyl-4-hydroxybenzoat (Parabene) kann es zu allergischen Reaktionen, auch mit Verzögerung, kommen.

Aufgrund des Gehaltes an Alkohol kann die häufige Anwendung des Arzneimittels auf der Haut Reizungen oder Entzündungen und Hauttrockenheit verursachen.

Was sollte bei Kindern beachtet werden?

Zur Anwendung von Kytta-Plasma[®] f bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Daher sollte Kytta-Plasma[®] f bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Bisher keine bekannt.

Dosierungsanleitung,

Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Kytta-Plasma[®] f nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Kytta-Plasma[®] f sonst nicht richtig wirken kann.

Wieviel und wie oft sollten Sie Kytta-Plasma[®] f anwenden?

Die Umschläge mit Kytta-Plasma[®] f können ein- bis zweimal täglich bis zu 5 Stunden (warme Umschläge nicht länger als 2 Stunden) angelegt werden.

Wie und wann sollten Sie Kytta-Plasma[®] f anwenden?

Kytta-Plasma[®] f normalerweise kalt anwenden. Zum warmen Umschlag die Tube im Wasserbad entsprechend temperieren. Ein angefeuchtetes Stück Verbandsmaterial wird mit beigefügtem Spatel auf einer ausreichenden Fläche (1-4 Handteller groß) ca. 1 mm dick mit Kytta-Plasma[®] f bestrichen, auf die erkrankte Körperstelle gelegt und mit einem Tuch abgedeckt. Die Fixierung kann mit einer Binde erfolgen.

Wie lange sollten Sie Kytta-Plasma[®] f anwenden?

Um bei empfindlicher Haut ein zu starkes Aufweichen zu vermeiden, sollte vor Erneuerung des Umschlages eine Pause von etwa 2-4 Stunden eingelegt werden. Nach mehrtägiger Anwendung empfiehlt sich eine Behandlungspause von 1-2 Tagen.

Die Anwendung kann bis zum Abklingen der Beschwerden oder nach Anweisung des Arztes weitergeführt werden.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Kytta-Plasma[®] f auftreten?

Wie alle Arzneimittel kann Kytta-Plasma[®] f Nebenwirkungen haben.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig: Mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig: Mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich: Mehr als 1 von 1.000 Behandelten
Selten: Mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten: 1 oder weniger von 10.000 Behandelten einschließlich Einzelfälle

In seltenen Fällen kann es zu Hautreizungen und Kontaktekzemen kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Sie sollten die Behandlung abbrechen und gegebenenfalls einen Arzt über die Fortsetzung der Behandlung befragen.

Haltbarkeit

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und auf der Tube aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach dem angegebenen Datum!

Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses:

1 Jahr

Wie ist Kytta-Plasma[®] f aufzubewahren?

Arzneimittel bitte für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht über 30°C lagern.

Stand der Information:

Juni 2006

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

weitere interessante Informationen und Tipps zum Thema „Muskel- und Gelenksbeschwerden“ haben wir für Sie in einem **kostenfreien** Ratgeber zusammengestellt.

Fordern Sie den Ratgeber „Muskel- und Gelenksbeschwerden“ **gratis** an:

Merck Selbstmedikation GmbH
Kytta-Patienten-Service

Röbberstr. 96

64293 Darmstadt

Tel: 061 51/8 56-260, Fax: 061 51/8 56-203

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auch im Internet unter www.kytta.de.

Bitte senden Sie mir kostenfrei den Kytta-Ratgeber „Muskel- und Gelenksbeschwerden“

Name, Vorname _____

Adresse _____

E-Mail _____

Telefon _____

(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

